

COMPARACIÓN DEL ABORTO QUIRÚRGICO Y EL ABORTO POR PÍLDORA EN CEDAR RIVER CLINICS

Aborto por píldora abortiva (Mifepristona o Mifeprex)

Aborto quirúrgico (Aspiración)

¿Cuánto tiempo de embarazo puedo tener?	Para mejor resultado (97%), hasta 9 semanas. Lo índices de éxito disminuyen según el embarazo avanza.	El primer trimestre es hasta las 12 semanas. Un embarazo con menos de 6 semanas aumenta la posibilidad de que falle el aborto.
¿Cuánto dura?	-Por lo regular 2 visitas al proveedor. -Se toma la mifepristona el primer día. -Se toma el misoprostol el día 2, 3 o 4. -Por lo regular dura varias horas para que ocurra el aborto. -Su siguiente cita será en dos semanas.	-Una visita a la clínica de 3 a 4 horas de duración. -El procedimiento del aborto toma de 3 a 5 minutos. -Su cita de seguimiento puede ser con su doctor o clínica, o los proveedores en 3 o 4 semanas.
¿Cuánto duele?	Desde calambres livianos a muy fuertes durante el aborto (comúnmente por un periodo de 1 a 3 horas). Le proporcionamos píldoras para el dolor para usarse según las necesite.	Calambres del útero desde livianos a fuertes durante el aborto (comúnmente por un periodo de 5 a 10 minutos). Puede optar por recibir medicamento para el dolor durante el procedimiento y después.
¿Cuánto voy a sangrar?	Por lo regular el sangrado es pesado y es común pasar coágulos de sangre durante el aborto. Más tarde, el sangrado es liviano por 9 a 14 días o más tiempo.	Por lo regular el sangrado es liviano a moderado y puede continuar hasta las 6 u 8 semanas.
¿Cuánto cuesta?	\$450 a \$567 en base a una escala de bajos ingresos.	\$450 a \$1275 (hasta las 12.0 semanas) en base a una escala de bajos ingresos.
¿Puede fallar el aborto?	Es el 97% efectivo. Cuando falla es necesario un aborto quirúrgico.	Es más que el 99% efectivo. Como el 1% de las veces falla y tendrá que repetirse.
¿Es seguro, y podré tener hijos en el futuro?	-Ambos medicamentos han sido estudiados formalmente y se han usado sin peligro. Las complicaciones posibles son muy raras. -La habilidad de tener hijos no se ve afectada, siempre y cuando no hayan complicaciones serias raras.	-El aborto quirúrgico ha sido estudiado formalmente por más de 25 años. El aborto durante el primer trimestre tiene menos del 1% de índice de complicación, y es al menos 10 veces más seguro que dar a luz. -La habilidad de tener hijos no se ve afectada, siempre y cuando no hayan complicaciones serias raras.
¿Cuáles son las ventajas?	-Puede resultarle más natural, como un malparto. -No se requiere inyecciones, anestesia, instrumentos, o máquina de succión, sólo si falla. -Puede terminarse el embarazo más temprano que con un aborto quirúrgico. -Estar en casa en vez de en una clínica puede resultarle más cómodo y privado. -Puede tener a cualquier persona a su lado para apoyarla durante el proceso del aborto.	-Es rápido, se termina en unos cuantos minutos. -Es muy exitoso. -Hay menos sangrado que con el método de aborto por píldora. -Hay menos tiempo que se pasa con los calambres que con el método de aborto por píldora. -Hay personal médico presente. -Puede hacerse cuando el embarazo esta más avanzado que con el aborto por píldora.
¿Cuáles son las desventajas?	-Dura varios días. -No es completamente predecible. -El sangrado puede ser bien fuerte y puede durar más que con un aborto quirúrgico. -Los calambres pueden ser muy dolorosos y por lo regular duran más que con un aborto quirúrgico. -Se requiere dos visitas de seguimiento con el proveedor, posiblemente más. -Falla más frecuentemente que el aborto quirúrgico.	-Un médico pondrá instrumentos dentro de su útero. -La anestesia y las drogas que se dan para ayudar con el dolor durante el procedimiento pueden causar efectos secundarios. -Las complicaciones son posibles, sin embargo se trata de menos del 1% de los casos. -La mujer tiene menos control sobre el proceso del aborto y quién puede estar presente. -La aspiradora de succión puede ser ruidosa. -No se puede hacer muy temprano en el embarazo como con el método de la píldora abortiva.